

3ワクチンが定期接種になりました!!

(ヒブ・小児肺炎球菌・子宮頸がん)

●問合先 保健センター ☎48-6000

予防接種法が改正され、4月1日(月)からヒブ・小児肺炎球菌・子宮頸がんの予防接種が定期予防接種になりました。協力医療機関(保健センター予定表、市ホームページ等で確認)に予約の上、「予診票」「母子健康手帳」「保険証」を持参して、接種を行ってください(病院によっては接種できないワクチンがありますので、予約時にご確認ください)。

- 平成25年3月までに配布していた「予診票」は引き続き使用できます。
- 次の内容で接種を受ける場合は自己負担額はありません。

	対象年齢(初回接種の年齢)	接種回数	接種間隔
ヒブ	生後2か月から7か月に至るまでの間	4回	初回免疫:27~56日の間隔で3回接種 追加免疫:3回目の接種から7~13か月後
	生後7か月に至った日の翌日から12か月に至るまでの間	3回	初回免疫:27~56日の間隔で2回接種 追加免疫:2回目の接種から7~13か月後
	生後12か月に至った日の翌日から60か月に至るまでの間	1回	1回のみ接種

	対象年齢(初回接種の年齢)	接種回数	接種間隔
小児肺炎球菌	生後2か月から7か月に至るまでの間	4回	初回免疫:27日以上の間隔で3回接種 追加免疫:3回目の接種から60日以上の間隔をおいて1回接種(標準は12~15か月齢の間に行う)
	生後7か月に至った日の翌日から12か月に至るまでの間	3回	初回免疫:27日以上の間隔で2回接種 追加免疫:2回目の接種から60日以上(標準として1歳以上)
	生後12か月に至った日の翌日から24か月に至るまでの間	2回	60日以上の間隔で2回接種
	生後24か月に至った日の翌日から60か月に至るまでの間	1回	1回のみ接種

	対象年齢	ワクチン名	接種回数	接種間隔
子宮頸がん	小学6年生から高校1年生までの相当年齢の女子 標準期間:中学1年生	サーバリックス	3回	2回目:1回目の接種から1か月後 3回目:1回目の接種から6か月後
		ガーダシル		2回目:1回目の接種から2か月後 3回目:1回目の接種から6か月後
ワクチンは必ず1回目に接種したワクチンを3回接種				